



GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 124 (21/87) du 14 Octobre 1987

/ Attention au **COLZA** : Mildiou et altises sur les très jeunes colzas /**COLZA**

Les stades de développement sont très variables et s'échelonnent du stade cotylédonaire jusqu'à 5 feuilles.

Les colzas semés tardivement se développent très lentement et sont donc exposés à divers problèmes.

ALTISES

Les captures en cuvette jaune sont variables (de 0 à 30 captures cumulées suivant les pièges) mais sur jeunes colzas des morsures sont notées de façon parfois importante.

Sur les colzas qui n'ont pas atteints le stade 2 feuilles, intervenir contre les altises.

Les colzas plus développés ne nécessitent pas d'intervention pour l'instant.

MILDIOU

Cette maladie se traduit sur la face supérieure des feuilles par des jaunissements et des ponctuations noires et face intérieure par des fructifications blanches à grises.

En cas de forte infestation et sur de très jeunes colzas au stade cotylédonaire, intervenir avec Acylon tabac à 1,5 kg.

A partir du stade une feuille du colza, il n'y a plus de risque.

AUTRES RAVAGEURS

D'autres ravageurs peuvent localement poser des problèmes :

- Larves de carabidae,
- Tenthredes de la rave,
- Limaces.

Se référer au bulletin précédent (N° 123) pour les préconisations.

- **Vers gris** : Ces insectes se cachent dans le sol pendant la journée. La nuit, ils sectionnent et dévorent les jeunes plantes. La larve que l'on trouve en grattant le sol est grise et s'enroule dès qu'on la touche.

Sur les jeunes colzas, en présence de dégâts et de vers gris, intervenir avec un des produits suivants en traitant le soir de préférence et en mouillant abondamment (800 l/ha au moins) Décis CE 0,3 l, Fastac 0,2 l, Ambush 0,2 l, Perthrine 0,2 l, Orthène 50 l, 8 kg ou cyperméthrine 30 g m.a./ha.

CEREALES**Jaunisse nanisante**

Situation : Des vols de pucerons vecteurs ont été détectés par le piège à suction d'Aigre jusqu'au 5 Octobre. La pluie et la chute des températures les ont interrompus.

Préconisation : Les risques de contamination des orges semées très tôt (rares) sont très importants si la levée est intervenue avant le 5 Octobre.

MAIS

Pyrale : La lutte contre ce ravageur commence dès l'automne par un broyage soigné des résidus de récolte et/enfouissement par un labour profond.

P 27



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE RÉGIONAL
DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
13, Rte de la Forêt - BIARD
86000 POITIERS Tél. : 49.58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes
Directeur Gérant : ~~XXXXXXXXXXXX~~ J.P. PIQUEMAL
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel : 130 F.
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles